


BRASIL

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **17,7**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017) **Muy Intenso**



Ocurrencia

17526

NUEVOS CASOS

16708 cutáneas (95,3%)

818 mucosas (4,7%)

ICLTc trienio* (2015-2017)



*El MS reportó 1297 casos desde municipios desconocidos que no fueron incluidos en el cálculo del índice compuesto de leishmaniasis.



GRUPO DE EDAD

3,2% < 5 años
4% ≥ 5 < 10 años
91,8% > 10 años
1% No especificado

7,2% niños
menores de 10 años



SEXO

72,7% Masculino
27,3% Femenino

56,4% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con **10** países
en **588** municipios

16,3% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

47,6% de la población
en zonas de transmisión

Mantuvo estable el %
de LC en menores de 10
años en comparación a la
línea de base del 2012-
2015 (Meta del Plan de
Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. lainsoni
L. lindenbergi
L. naiffi
L. shawi



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L. reducta*, *L. olmeca nociva*, *L. whitmani*, *L. neivai*, *L. migonei*, *L. carrerai carrerai*, *L. intermedia*, *L. complexa*, *L. wellcomei*, *L. davisii*, *L. fischeri*, *L. pessoai*, *L. umbratilis*, *L. anduzei*, *L. ubiquitalis*, *L. antunesi*, *L. ayrozai*, *L. squamiventris*, *L. paraensis*, *L. edwardsi*, *L. amazonensis*



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
83,1%

Cura clínica: **69,8%**

% Pacientes curados entre
los tratados: **74,1%**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de Meglumina
Anfotericina B
Desoxicolato
Anfotericina B Liposomal
Isetionato de Pentamidina