


COLOMBIA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2015



Incidencia
(100.000 hab.) **33,6**
Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Intenso**

Ocurrencia
7541
NUEVOS CASOS
7464 cutáneas (99%)
77 mucosas (1%)

ICLc



GRUPO DE EDAD

4,8% < 5 años
6,1% ≥ 5 < 10 años
88,8% > 10 años
0,3% Desconocido

10,9% niños
menores de 10 años



SEXO

76,4% Masculino
23,6% Feminino

57% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con **5** países
en **42** municipios

6,8% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

46% de la población en
zonas de transmisión

Notificación obligatoria y
individual

Realiza el control químico
del vector



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. mexicana
L. colombiense
L. guyanensis
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L. colombiana*, *L. spinicrassa*, *L. pia*, *L. towsendi*, *L. hartmanni*, *L. umbratilis*, *L. longiflora*, *L. trapidoi*, *L. panamensis*, *L. yulli yulli*, *L. cruciata*, *L. colombiana*, *L. gomezi*



ASISTENCIA AL PACIENTE

Tratamiento gratuito en el
sistema público de salud

Diagnóstico de laboratorio:
100%

Cura clínica: **Sin
infomación**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Fuente:

SisLeish - OPS/MS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: Diciembre, 2016



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas