

COLÔMBIA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2016

Incidência
(100.000 hab.) **52,93**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Intenso**

Ocorrência

10966*

NOVOS CASOS

10865 cutâneas (99,1%)

101 mucosas (0,9%)

ICLc



*O MS reportou 844 casos adicionais que não puderam ser incluídos no SisLeish porque o sistema não permite a inclusão de casos de municípios desconhecidos ou não incluídos.



GRUPO DE IDADE

4,9% < 5 anos
7,7% ≥ 5 < 10 anos
87% > 10 anos
0,4% Não especificado

12,6% crianças
menores de 10 anos



SEXO

70% Masculino
30% Feminino

62,9% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **5** países
em **42** municípios

3,5% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

42,5% da população em
áreas de transmissão

Participa do **PEED**
(Programa Regional de
Avaliação Externa Direta
de Desempenho para o
diagnóstico microscópico)



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. mexicana
L. colombienseis
L. guyanensis
L. panamensis



VETORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L.*
colombiana, *L. spinicrassa*, *L.*
pia, *L. towsendi*, *L.*
hartmanni, *L. umbratilis*, *L.*
longiflora, *L. trapidoi*, *L.*
panamensis, *L. yulli yulli*, *L.*
cruciata, *L. columbiana*, *L.*
gomezi



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
100% (S/I laboratórios
que fazem diagnóstico)

Cura clínica: **S/I** (**922**
unidades de atenção que
fazem tratamento)



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Isetionato de
Pentamidina

Miltefosine