

COLOMBIA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia
(100.000 hab.) **52,93**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Intenso**

Ocurrencia

10966*


NUEVOS CASOS

10865 cutáneas (99,1%)

101 mucosas (0,9%)

ICLc

18,78 - 31,96 (Muy intenso)
9,54 - 18,77 (Intenso)
3,58 - 9,53 (Alto)
0,41 - 3,57 (Medio)
-1,09 - 0,40 (Bajo)



**El MSPS reportó 844 casos adicionales que no pueden ser incluidos en el SisLeish por que el sistema no permite la inclusión de casos de municipios desconocidos o no incluidos*



GRUPO DE EDAD

4,9% < 5 años
7,7% ≥ 5 < 10 años
87% > 10 años
0,4% No especificado

12,6% niños
menores de 10 años



SEXO

70% Masculino
30% Feminino

62,9% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **5** países
en **42** municipios

3,5% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

42,5% de la población
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**
(Programa Regional de
Evaluación Externa
Directa del Desempeño
para el diagnóstico
microscópico)



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. mexicana
L. colombiense
L. guyanensis
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L. colombiana*, *L. spinicrassa*, *L. pia*, *L. towsendi*, *L. hartmanni*, *L. umbratilis*, *L. longiflora*, *L. trapidoi*, *L. panamensis*, *L. yulli yulli*, *L. cruciata*, *L. colombiana*, *L. gomezi*



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
100% (S/I laboratorios
hacen el diagnóstico)

Cura clínica: **S/I** (**922**
unidades de atención
hacen el tratamiento)



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Isetionato de Pentamidina

Miltefosina