

COLÔMBIA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2018

Incidência
(100.000 hab.) **26,2**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2016-2018) **Intenso**

Ocorrência

6362

NOVOS CASOS

6273 cutâneas (98,6%)

89 mucosas (1,4%)

ICLTc triênio
(2016-2018)



*O MS reportou 95 casos de municípios desconhecidos que não foram incluídos nos cálculos do índice composto de leishmanioses.



GRUPO DE IDADE

3,4% < 5 anos
5,2% ≥ 5 < 10 anos
89,7% > 10 anos
1,7% Não especificado

8,6% crianças
menores de 10 anos



SEXO

76,7% Masculino
21,8% Feminino
1,5% Não especificado

73,1% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **05**
países em **42**
municípios

22% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

51,9% da população em
áreas de transmissão

Diminuição da % de LC
em menores de 10 anos
em relação ao ano
anterior (Meta do Plano
de Ação 2017-2022).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. mexicana
L. colombiense
L. guyanensis
L. panamensis
L. laisoni
L. naiffi
L. venezuelensis



VETORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L.*
colombiana, *L.*
spinicrassa, *L. hartmanni*,
L. umbratillis, *L.*
longifloca, *L. trapidoi*, *L.*
panamensis, *L. gomezi*



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
100%

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumine

Anfotericina B
Lipossomal


Isetionato de
Pentamidina

COLÔMBIA

Leishmaniose visceral 2018

Incidência
(100.000 hab.) **2,65**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Visceral
Triênio (ICLTc 2016-2018) **Alto**



Ocorrência

16

NOVOS CASOS DE
LEISHMANIOSE
VISCERAL

ICLTv triênio (2016-2018)



GRUPO DE IDADE

81,3% < 10 anos
12,5% ≥ 10 < 50 anos
6,2% ≥ 50 anos

75% crianças
menores de 5 anos



SEXO

56,3% Masculino
43,7% Femenino

50% homens
menores de 10 anos



LETALIDADE

0 mortes por
leishmaniose visceral

0% de taxa de
letalidade



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
S/I

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



ESPÉCIE DE LEISHMANIA

L. infantum



VETORES LUTZOMYIA

L. longipalpis
L. evansi



VIGILÂNCIA

Transmissão
estável/controlada

Ciclo **doméstico**
rural/urbano

Reservatório doméstico:
Cão



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
Lipossomal